

**ОТЗЫВ**  
**официального оппонента**  
**заведующего кафедрой общей хирургии**  
**Федерального государственного бюджетного образовательного**  
**учреждения высшего образования**  
**«Ярославский государственный медицинский университет»**  
**Министерства здравоохранения Российской Федерации**  
**доктора медицинских наук, профессора Ларичева А.Б.**  
**на диссертацию Романцова Михаила Николаевича**  
**«Комбинированное применение гемостатических средств**  
**и гранулированного сорбента в лечении кровотечений**  
**из гастродуоденальных язв**  
**(экспериментально-клиническое исследование)»,**  
**представленную на соискание ученой степени**  
**кандидата медицинских наук**  
**по специальности 14.01.17 – хирургия**

**Актуальность темы**

В числе проблемных заболеваний хирургического профиля особое место занимают гастродуоденальные кровотечения различной этиологии. Они вносят разный вклад в неприятную результирующую – летальный исход, однако его развитие во всех ситуациях не только крайне желательно, но и необходимо минимизировать. К сожалению, до сих пор нет по-настоящему действенных средств и способов, которые исключают рецидивы геморрагии вообще и тем более носящие фатальный характер. В тенденциях современной хирургической практики приоритеты справедливо отдаются эндоскопическим методам гемостаза, и усиление их позитивности лекарственной терапией или другими медикаментозными воздействиями только приветствуется. Довольно велик арсенал средств местного приложения на зону дефекта слизистой, в том числе использование препаратов, имеющих в своём составе коллаген и желатин (желатиновая губка и коллагеновая губка, сургичесель и коллагеновая пластина). Не менее интересен опыт использования порошкообразных полимеров типа гелевина. Клиническая практика обнажила ряд недостатков, включая элементарные неудобства в их применении. В частности, отсутствие желаемой адгезивности и быстрого растворения при контакте с кровью не позволяет реализовать гемостатический потенциал используемых средств. Не успев оказать должное действие, они «исчезают из поля зрения», и возникает потребность во введении новых порций препарата. Логичным представляется сочетание подобных средств. Собственно этому и посвящено диссертационное исследование М.Н. Романцова «Комбинированное применение гемостатических средств и гранулированного сорбента в лечении кровотечений из гастродуоденальных язв», что определяет актуальность и научно-практическую значимость темы.

