

## ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертации Самир Гарти Четри на тему:

### **«Эффективность лечебно-профилактических мероприятий у больных хроническим генерализованным пародонтитом на фоне сахарного диабета II типа»,**

**представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – стоматология**

Несмотря на повышение качества стоматологической помощи воспалительные заболевания пародонта являются одной из наиболее сложных проблем стоматологии. Актуальность эта проблема приобретает у больных на фоне патологии систем пищеварения, кровообращения, нарушения обмена веществ и эндокринных расстройств и, в частности, у больных сахарным диабетом. Биологическая связь сахарного диабета с заболеваниями пародонта подтверждена многочисленными исследованиями российских и зарубежных авторов. Появляются исследования, говорящие об отрицательном влиянии пародонтальной микрофлоры на показатели гликемического контроля. Основным принципом поддерживающей терапии является динамический контроль клинико-лабораторных показателей состояния тканей пародонта для выявления признаков активности воспалительно-деструктивного процесса.

Таким образом, устранение очагов хронической инфекции в полости рта приобретает значимость не только с точки зрения сохранения функции зубочелюстной системы, но и может повлиять на течение эндокринного заболевания.

В связи с вышеизложенным, актуальность проведенного клинико-лабораторного исследования не вызывает сомнений.

Автором проведено стоматологическое обследование 260 больных сахарным диабетом 2 типа с разной длительностью сопутствующего заболевания в возрасте от 45 до 59 лет. Распределение пациентов по группам проводилось в зависимости от длительности течения сахарного диабета. В первую группу были включены пациенты с сахарным диабетом (24 человека), диагностированным впервые. Вторую группу (28 человек) составили лица с длительностью заболевания свыше 10 лет. Обе группы были сопоставимы по полу, возрасту и состоянию стоматологического здоровья.

Работа проведена в дизайне открытого, проспективного, сравнительного, клинического исследования.

В качестве контрольных значений при оценке эффективности проводимых мероприятий расценивались показатели до лечения.

В работе дана оценка клинико-лабораторной эффективности, показана и обоснована значимость дифференцированного подхода в лечении

