

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Хомочкиной Наталии Витальевны
«Сравнительная оценка межсфинктерной перевязки и иссечения свища со швом анального жома при лечении свищей прямой кишки», представленной
к официальной защите на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.17 – хирургия**

Внедрение органосохраняющих способов хирургического лечения чрессфинктерных свищей прямой кишки позволяет в значительной степени сохранить функциональное состояние запирающего аппарата прямой кишки в послеоперационном периоде. На этом фоне ведется постоянный поиск эффективных средств и методов лечения хронического парапроктита, но по-прежнему общепринятыми и наиболее распространенными остаются классические способы хирургического лечения, подразумевающие значительную интраоперационную травму мышечных структур запирающего аппарата прямой кишки. Поэтому тематический выбор автора и соответствующее этому выбору проведенное исследование определяют несомненную актуальность работы.

В автореферате на основе многофакторного анализа, на базе клинического материала, изучены результаты применения органосохраняющей операции лигирования свищевого хода в межсфинктерном пространстве прямой кишки и классической операции иссечения свища со швом сфинктера. Подробно освещена частота развития рецидива заболевания и послеоперационных осложнений при использовании того, или иного способа лечения. Выявлено, что развитие рецидива свища по типу транссфинктерного происходит значительно реже при использовании операции лигирования свища в межсфинктерном пространстве, чем при операции иссечения свища с первичной реконструкцией сфинктера. Впервые предложен способ предупреждения развития рецидива заболевания по типу чрессфинктерного свища при использовании операции LIFT. Убедительно доказано, что функция анального жома при использовании органосохраняющей операции значительно выше и операция не приводит к таким тяжелым последствиям как развитие анальной инконтиненции. Проведен сравнительный анализ динамики восстановления пациентов исследуемых групп в послеоперационном периоде, по результатам которого показатели выше у пациентов после операции перевязки свищевого хода в межсфинктерном пространстве.

Практическая значимость данного исследования заключается в улучшении результатов хирургического лечения чрессфинктерных параректальных свищей посредством перевязки свищевого хода в межсфинктерном пространстве прямой кишки. С практической точки зрения обращает на себя внимание доступность для широкого круга применения и эффективность данного способа. В работе прослеживается согласованность содержания и темы исследования.

Все опубликованные автором научные работы соответствуют ключевым разделам диссертационной работы.

